

LYMPHANGITE

DEFINITION

- La lymphangite est une inflammation des vaisseaux lymphatiques
- le plus souvent due à des bactéries, émanant d'une blessure de la peau.
- Régulièrement, les ganglions lymphatiques avoisinants sont également touchés ; on parle alors de lymphadénite.

ETIOLOGIES

- les bactéries (le plus souvent des streptocoques, plus rarement des staphylocoques), qui par le biais d'une blessure de la peau, parviennent jusqu'aux vaisseaux lymphatiques.
- Des inflammations dues à des mycoses ou à des substances toxiques sont rarissimes.

CLINIQUE

- se traduit par un cordon rouge, allant de la blessure le long des vaisseaux lymphatiques en direction du cœur (milieu du thorax).
- Les vaisseaux lymphatiques irrités ainsi que le tissu avoisinant sont douloureux et gonflés.
- Les ganglions lymphatiques à proximité peuvent également être touchés et deviennent, à leur tour, douloureux et gonflés.
- S'ajoutent les signes d'infection généraux : la fièvre, frémissement de fièvre, ainsi qu'une sensation générale de maladie.

DIAGNOSTIC SE BASE SUR:

- l'anamnèse du patient .
- l'aspect caractéristique de la peau
- le gonflement et la douleur ressentie lors de la palpation des ganglions lymphatiques avoisinants
- chercher l'origine de l'infection, ce qui s'avère être souvent plus difficile.

COMPLICATIONS

- Des infections récurrentes des vaisseaux lymphatiques peuvent endommager ces derniers de manière durable.

En conséquence, l'écoulement de la lymphe est perturbé, ce qui conduit à la formation d'un lymphœdème (gonflement de la peau et des tissus conjonctifs suite à une accumulation du liquide lymphatique).

- Théoriquement, une lymphangite non traitée peut engendrer **une septicémie**.
- C'est pour cette raison qu'une consultation médicale reste impérative lors de tous signes cliniques pouvant suggérer une éventuelle lymphangite

TRAITEMENT

- En général, antibiotique
- L'inflammation diminue après quelques jours de traitement seulement.
- De plus, la partie du corps affectée doit être immobilisée et mise au repos (p.ex. : pour le bras, une attèle ; pour le pied, l'immobilisation au lit).
- Le traitement local; appliquer des pansements alcoolisés (refroidissant et désinfectant) ainsi que des crèmes anti-inflammatoires.
- Le cas échéant, la source d'infection doit être traitée de manière chirurgicale (p.ex. inciser et drainer un abcès).

